

# MEDICAMENTOS PELIGROSOS

*¡Protegete!*



## GRUPO 3: RIESGO PARA EL PROCESO REPRODUCTIVO

PUEDEN AFECTAR MUJERES Y HOMBRES QUE ESTÁN INTENTANDO CONCEBIR DE FORMA ACTIVA, A MUJERES EMBARAZADAS Y EN PERÍODO DE LACTANCIA.

Acenocumárol, Ácido Valproico, Clonazepam, Colchicina, Fluconazol, Oxitocina, Paroxetina, Topiramato, Voriconazol.

### PREPARACIÓN:

NO SE PRECISA PROTECCIÓN SALVO QUE SE ESTÉ EN SITUACIÓN DE RIESGO REPRODUCTIVO

- Dosis unitarias de suspensiones orales, fraccionamiento o pulverización -> Servicio de Farmacia
- Solución inyectable y perfusión -> CONTACTAR CON SPRL

### ADMINISTRACIÓN:

SÓLO AFECTA A PERSONAL EN RIESGO REPRODUCTIVO

Comprimido/cápsula



--- Guante simple

Solución oral (frasco)



Doble guante y bata, si riesgo de salpicadura y/o inhalación, protección ocular y/o respiratoria.

Solución perfusión (Vial, frasco, bolsa)



Doble guante y bata, si riesgo de salpicadura y/o inhalación, protección ocular y/o respiratoria.

Solución inyectable



Doble guante y bata, si riesgo de salpicadura y/o inhalación, protección ocular y/o respiratoria.



SI RIESGO REPRODUCTIVO -> NO FRACCIONAR NI TRITURAR!! NO ABRIR LAS AMPOLLAS!! NO PREPARAR LOS VIALES!! CLONAZEPAN Y OXITOCINA -> Contactar con SPRL

# MEDICAMENTOS PELIGROSOS

**SATSE**

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) tiene la obligación de proteger a sus profesionales en la manipulación y administración de medicamentos peligrosos.

*¡Protegete!*

### PROTECCIÓN RESPIRATORIA:



Mascarilla autofiltrante tipo FFP3 según norma UNE-EN 149:2001+A1:2010. Las mascarillas quirúrgicas no protegen frente a aerosoles.

### PROTECCIÓN OCULAR:



Deben ser panorámicas, con protección lateral según la norma UNE-EN 166:2002 y la UNE-EN 168:2002.

### BATA O MONO:




Debe ser desechable de manga larga, con puños elásticos y apertura trasera. Es recomendable que cumpla con las normas UNE-EN-ISO 13688:2013 y UNE-EN 13034:2005+A1:2009

### DOBLE GUANTE:



Con carácter general, de neopreno, nitrilo o poliuretano. Como medida de protección adicional, en caso de contacto probado o presumible con el medicamento, el guante debe retirarse con cuidado y sustituirse por otro.



Ante la duda, consulta en el buscador de MP del INSSBT.

# MEDICAMENTOS PELIGROSOS

¡Protégete!



## GRUPO 1:

### ANTINEOPLÁSICOS

*Bleomicina, Bortezomib, Capecitabina, Cisplatino, Ciclofosfamida, Fluorouracilo, Metotrexato, Mitomicina.*

## GRUPO 2:

### NO ANTINEOPLÁSICOS

CUMPLEN AL MENOS UN CRITERIO (carcinogenicidad, teratogenicidad, toxicidad reproductiva, toxicidad en órganos a bajas dosis, genotoxicidad).

*Carbamazepina, Ciclosporina, Espironolactona, Fenitoína, Sirolimus, Tacrolimus.*

## GRUPO 3:

### RIESGO PARA EL PROCESO REPRODUCTIVO

PUEDEN AFECTAR MUJERES Y HOMBRES QUE ESTÁN INTENTANDO CONCEBIR DE FORMA ACTIVA, A MUJERES EMBARAZADAS Y EN PERIODO DE LACTANCIA.

*Acenocumarol, Ácido Valproico, Clonazepam, Colchicina, Fluconazol, Oxitocina, Paroxetina, Topiramato, Voriconazol.*



Esto son solo ejemplos, consulta la preparación y administración en el buscador de MP del INSSBT

# MEDICAMENTOS PELIGROSOS

¡Protégete!



## GRUPO 1:

### ANTINEOPLÁSICOS

## GRUPO 2:

### NO ANTINEOPLÁSICOS

#### PREPARACIÓN:

- Dosis unitarias de suspensiones orales, fraccionamiento o pulverización -> Servicio de Farmacia
- Solución inyectable y perfusión -> Servicio de Farmacia

#### ADMINISTRACIÓN:

Comprimido/gragea/cápsula



----- Guante simple



NO FRACCIONAR NI TRITURAR!!

Solución oral  
(frasco)



Doble guante y bata; si riesgo de salpicadura y/o inhalación, protección ocular y/o respiratoria.

Jeringa precargada  
(Metotrexato)



Doble guante y bata; si riesgo de salpicadura y/o inhalación, protección ocular y/o respiratoria.

Solución inyectable



Doble guante y bata; si riesgo de salpicadura y/o inhalación, protección ocular y/o respiratoria.

Solución perfusión  
(Vial, ampolla)



Doble guante y bata; si riesgo de salpicadura y/o inhalación, protección ocular y/o respiratoria.